

Uslovi boravka u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača

za vreme trejanja pandemije izazvane

virusom SARS-CoV-2 (COVID-19)

- **Protivpandemijske mere koje su na snazi u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača su:**
 1. Na glavnom ulazu (koji je u ovim okolnostima jedino i otvoren), postavljeno je jasno vidljivo, štampano obaveštenje namenjeno kako pacijentima tako i zaposlenima, o merama koje se moraju poštovati prilikom ulaska i boravka u ustanovi;
 2. Takođe na ulazu, ali i u svim drugim delovima objekta, gde je potrebno postavljena je dezo barijera;
 3. Pored dezo barijere postavljen je automat za bezkontaktnu dezinfekciju ruku, koja je obavezna za svaku osobu koja ulazi u ustanovu;
 4. Obavezno je nošenje zaštitne maske za vreme boravka u objektu Bolnice;
 5. **Pacijenti koji dolaze na stacionarno lečenje mogu biti primljeni bez predhodno urađenog Ag testa, ukoliko dostave potvrdu da su primili obe doze vakcine, i da je od druge doze prošlo minimum dve nedelje. Svi ostali pacijenti moraju doneti negativan PCR ili Ag test, ne stariji od 48 sati;**
 6. Pacijenti se smeštaju u sobe u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravlje;
 7. Stacionarnom pacijentima se meri temperatura pri prijemu kao i dva puta dnevno u toku boravka na rehabilitaciju, a ambulatnim pacijentima svaki put kada dolaze na terapiju;
 8. Organizovano je vremensko i prostorno zoniranje terapija za ambulantne pacijente i za pacijente na stacionarnom lečenju;

9. U toku same terapije postoji fizička distanca od 2m između pacijenata, a posle izvršene terapije, vrši se obavezna dezinfekcija svih površina sa kojima je pacijent dolazio u kontakt;
10. Posete pacijentima koji su na stacionarnom lečenju nisu dozvoljene;
11. Pri najmanjoj sumnji na COVID-19 infekciju, pacijent se stavlja u izolaciju i vrši AG testiranje, isto važi i za osobe sa kojim je bio u kontaktu;
12. U restoranskom delu bolnice hrana se služi u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravlje;
13. U Wellness i Spa bloku takođe se poštuju navedene preporuke Zavoda za javno zdravlje.